Nouveaux Coléoptères Dascillides de Sumatra,

par

M. Pic. [1])

Dascillus Corporaali n. sp. Elongatus, parum convexus, dense griseo-olivaceo-pubescens, niger; elytris minute striatis.

Allongé, peu convexe, noir, densément revêtu (au moins à l'état frais) d'une pubescence couchée fine d'un gris olivâtre. Antennes noires, pas très robustes; prothorax court, subsillonné au milieu, subarqué sur les cotés et frangé, subtronqué au milieu en avant avec les angles antérieurs peu avancés, sinué postérieurement, à lobe médian tronqué ou subéchancré; écusson grand; élytres à peine plus larges que le prothorax, longs, peu rétrécis au sommet, finement striés, intervalles densément ponctués; pattes foncées pubescentes. Long. 13—15 mill. Brastagi, 5, 1918.

Peut se placer près de *D. pruinosus* Fairm. (ex descriptione) mais ce dernier est oblong, moins foncé et n'a pas les antennes toutes noires. Je suis heureux de dédier cette espèce et une de celles qui suivent à l'habile récolteur qui me l'a fait connaître avec de nombreuses autres nouveautés de diverses familles.

Ptilodactyla vicina n. sp. ♀. Oblonga, subelongata, nitida, sparse griseo-pubescens, nigra, membris abdomineque apice rufo-testaceis; thorace transverso, fortiter sat sparse punctato-pupillata; elytris latis, apice attenuatis, striato-punctatis, intervallis subconvexis, fortiter punctatis.

Oblong et un peu allongé, brillant, éparsement pubescent de gris, noir avec les membres et le sommet de l'abdomen d'un roux testacé. Tête grosse avec les yeux gros et très écartés, ponctuée à peu près comme le prothorax; antennes grêles, à 2e article subglobuleux, 3e très long; prothorax

[1]) Les insectes décrits ici ont été recueillis à Sumatra par mon estimable collègue Corporaal et figurent dans les collections Pic et Corporaal.

transversal, un peu rétréci en avant, en partie déprimé en dessus, à ponctuation pupilleuse forte et écartée par places, à la base surtout, base sinuée, angles postérieurs teintés de roux; écusson pas très grand, ponctué; élytres larges et relativement courts, atténués postérieurement, strié-ponctués, les stries internes étant un peu obliques, intervalles subconvexes et fortement ponctués; pattes testacé-roussâtres avec les tibias parfois un peu rembrunis. Long. 5—5,3 mill. Lau Rakit, 2, 1918.

Espèce très voisine de *P. medanensis* Pic, en diffère par le 2e article des antennes globuleux, au lieu d'être un peu triangulaire, les yeux clairs, au lieu d'être foncés, la ponctuation, en partie plus écartée, du prothorax, etc.

Ptilodactyla Corporaali n. sp. ♀. Subelongata, parum nitida, sat sparse griseo-pubescens, nigra, pro parte rufescens, capite antice, abdomine apice membrisque testaceis; thorace satis breve, dense punctato; elytris apice attenuatis, substriatis et minute punctatis.

Suballongé, un peu brillant, assez éparsément pubescent de gris, noir teinté de roussâtre par places, devant de la tête, sommet de l'abdomen et membres testacés. Tête large, yeux gros, foncés, écartés; antennes grêles, à 2e article court, 3e long; prothorax assez court; rétréci en avant, déprimé postérieurement, densément ponctué, sinué à la base; élytres pas très longs, atténués postérieurement, faiblement striés par places avec quelques rangées de points, intervalles déprimés, peu ponctués, épipleures roux; pattes testacées. Long. 3 mill. Medan, 24, 3, 1920.

Espèce voisine de *P. ocularis* Pic, très distincte par sa forme moins allongée, sa coloration plus foncée et les élytres non nettement striés.

Ptilodactyla Rouyeri v. nov. *notaticollis*. Parum elongata, rufa, capite postice, thorace in disco plus minusve, abdomine pro parte antennisque apice nigris, antennis ad basin pedibusque testaceis. Long. 5 mill. Sibolangit, 26, 7, 1920 et Brastagi, 5, 1918.

Distinct, à première vue, de *Rouyeri* Pic, par la coloration et la forme moins étroite.